



# POUČENÍ DÁRCE KRVE

## VÝZNAM DOBROVOLNÉHO A NEPLACENÉHO DÁRCOVSTVÍ

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a dárce tak mnohdy svým darem „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený život.

Aby transfúze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Bezpečnost transfúze začíná právě u dárce.

Preferujeme bezplatné dárcovství krve. Pokud dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod zatajovat údaje o svém zdravotním stavu (např. rizikový způsob života). Ohrožení příjemce se tak snižuje.

Doporučujeme pravidelné dárcovství krve. Dárce je vyšetřen 4 až 5 krát v roce. Kromě minimalizace rizika přenosu infekce příjemci získá dárce pravidelné vyšetření, které má charakter preventivní prohlídky.

## POVINNOSTI DÁRCE KRVE:

- \* Pečlivě se seznámit s dokumenty Poučení dárce krve a Prohlášení na dotazníku
- \* Prohlášení dárce potvrdit svým podpisem
- \* Pravdivě odpovídat na dotazy v Dotazníku pro dárce krve a při lékařském vyšetření
- \* Pravdivě vyplnit formulář „Použití mé krve“ a vhodit jej do určené schránky
- \* Oznamit transfúznímu oddělení dodatečně zjištěné onemocnění, které by mohlo mít vliv na kvalitu odebrané krve. Jedná se o akutní onemocnění, které vznikne do 3 až 5 dnů od odběru (např. nachlazení, průjem, zvracení s horečkou i bez horečky) a dále každé závažné onemocnění v jakémkoliv časovém odstupu od odběru krve (nádorové onemocnění, autoimunní onemocnění apod.).
- \* Oznamit transfúznímu oddělení jakoukoliv komplikaci po odběru krve.

# I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVŇÍ TRANSFÚZE

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfúze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví přenosných infekcí je celá řada, nejvýznamnější jsou infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.

**výběrem vhodného dárce** ← **Riziko přenosu infekce se snažíme snížit** → **vyšetřením odebrané krve**

## VÝBĚR DÁRCE

**Riziko výskytu nemoci přenosné krví trvale nebo dočasně zvyšuje například:**

- \* rizikové sexuální chování
  - pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
  - střídání náhodných sexuálních partnerů
  - pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
  - pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
  - pohlavní styk s osobou provozující prostituci
  - pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
  - pohlavní styk s osobou, která je léčena transfúzními přípravky a/nebo krevními deriváty
- \* úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
- \* výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině
- \* pobyt ve Velké Británii a Francii (déle než 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci), podání transfúze ve Velké Británii po roce 1980
- \* tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. provedené mimo zdravotnické zařízení
- \* potřísnění sliznice nebo poranění kůže infekčním materiálem
- \* endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest)
- \* transfúze (podání transfúzního přípravku)
- \* léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
- \* operace
- \* neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny, transplantace rohovky
- \* transplantace s použitím štěpu zvířecího původu, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu
- \* pobyt v nápravném zařízení (vězení)
- \* léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu
- \* toxikomanie a alkoholismus
- \* užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

**Máte právo klást otázky týkající se odběru a právo kdykoliv od odběru odstoupit.**

**V případě pochybností se poraďte s lékařem transfúzního oddělení nebo přistupte k samovyloučení.**

## SAMOXYLOUČENÍ


Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfúze (jednorázový kontakt s osobou s vyšším rizikem infekce, větší konzumace alkoholu či požití některých léků) a nechcete-li o problému hovořit s lékařem, prosíme, odstupte od odběru nebo využijte možnosti tzv. **diskrétního samovyloučení** – tj. označte na formuláři z vyšetřovny „Použití mé krve“ pravdivou

odpověď a vhodte do určené schránky před odběrovým sálem nebo v kanceláři. Odebraná krev, kde dárce vyjádřil nesouhlas s použitím nebo neoznačil žádnou z variant nebo formulář neodevzdal, bude zlikvidována.

### DALŠÍ RIZIKA

Příjemce transfúze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. – isotretinoin (např. Accutane, Roaccute), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar), dutasterid (např. Avodart). Délka vyřazení dárce závisí na léku a na způsobu jeho podávání.

Riziko přenosu infekce zvyšuje pobyt dárce v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie, Chagasovy choroby nebo horečky Q, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky, aj.).



### VYŠETŘENÍ ODEBRANÉ KRVE

Kromě vyplnění dotazníku dárce krve, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfúzních přípravků na přítomnost známek infekce:

- \* HBV (žloutenka B)
- \* HIV (původce AIDS)
- \* HCV (žloutenka C)
- \* syfilis (lues, příjice)

I přes uvedený způsob vyšetření není možné zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může „trvat“ několik týdnů, než protilátku po „nakažení“ vytvoří). Spolupráce s dárce a naprostá důvěra má tedy zásadní význam. V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete informováni. Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství krve.

***Nedarujte krev za účelem skrytého vyšetření infekce, např. HIV. Ohrožujete tím příjemce vaší krve!!!***

Odebraná krev a její složky budou k léčbě pacientů použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich jakost a bezpečnost.

**Údaje o zdravotním stavu dárce** uchováváme v jeho dokumentaci a při zachování zásad ochrany osobních údajů a lékařského tajemství poskytujeme část z nich po souhlasu dárce do Národního registru transfúzní služby, Českému červenému kříži, příp. referenční laboratoři pro infekční choroby.

## II. RIZIKO PRO DÁRCE KRVE

### ODBĚR KRVE ČI KREVNÍCH SLOŽEK NE ZCELA ZDRAVÉMU DÁRCI

Odběr krve nebo krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce. Proto provádíme základní vyšetření, která slouží k posouzení zdravotního stavu dárce. Všechny abnormálních nálezy jsou dárce oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství krve odpovídá lékař transfúzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení je dárce informován.

### NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA ODBĚR

**Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:**

- \* krevní výron, modřina (krvácení do podkoží po vpichu) - riziko této komplikace můžete snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru po dobu několika minut na natažené paži
- \* celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny nedostatečným přizpůsobením krevního oběhu změnám při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí - ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, unavených a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla
- \* u přístrojových odběrů (kde je krev mimotělně míšena s protisrážlivým roztokem) může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.) - pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím. Proto je velice důležité, aby dárce hlásil již první příznaky.

**Všechn materiál používaný k vlastnímu odběru krve, krevních složek i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně na jednorázové použití.**

**ŽÁDNÉ RIZIKO PŘENOSU JAKÉKOLIV KRVÍ PŘENOSNÉ INFEKCE NA DÁRCE NEHROZÍ !**

## III. PRÁVA DÁRCE KRVE

**Dárce krve má právo:**

- \* kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
- \* klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
- \* na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
- \* na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
- \* na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfúzního přípravku z nich vyrobeného
- \* vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je darovaná krev podrobena
- \* vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
- \* na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti
- \* na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
- \* na soukromí při pohovoru s lékařem a v průběhu klinického vyšetření
- \* na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování krve a zdravotního stavu
- \* na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů

**Zařízení transfúzní služby má konečnou odpovědnost za jakost a bezpečnost odebírané krve a krevních složek, proto má právo definitivně rozhodnout o přijetí či vyřazení dárce.**

**DAROVÁNÍ KRVE SE NEPOVAŽUJE ZA „LIDSKÉ PRÁVO“.**