

PŘEDEJTE SVÉMU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
žádáme Vás o předoperační vyšetření u pana/paní:

Identifikační štítek pacienta	<i>Diagnóza, pro kterou je pacient přijímán:</i>
Jméno a příjmení pacienta:	
Rodné číslo pacienta:	<i>Plánovaný výkon:</i>
Datum narození (není-li RČ) Kód ZP:.....	
Adresa trv. pobytu (případně jiná adresa):.....	<i>Plánované datum přijetí:</i>

Požadavky pro předanestetické vyšetření vychází z doporučeného postupu ČSARIM z 18. 5. 2009 a z Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony, publikovaného ve Věstníku MZ ČR 1/2018.

Interní předoperační vyšetření (zhodnocení klinického stavu)

Základem je pečlivá anamnéza – osobní, alergologická, farmakologická, abúzus, nynější onemocnění, fyzikální vyšetření, event. doporučení ke konziliárnímu vyšetření, zhodnocení ASA klasifikace

1. Pacienti bez komplikujícího onemocnění - ASA I

Provádí praktický lékař:

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
- krevní obraz, močový sediment včetně chemického vyšetření
- koagulační parametry (INR, PTT)
- urea, kreatinin, glykémie (nad 50 let)
- RTG plic (nad 60 let, respirační onemocnění a kuřáci nad 40 let)
- EKG (nad 40 let), křivku prosíme sebou
- vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon

Platnost vyšetření ne starší 1 měsíc.

2. Pacienti s komplikujícím onemocněním - ASA II – IV

Provádí praktický lékař, interní lékař:

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
- krevní obraz, močový sediment včetně chemického vyšetření
- koagulační parametry (INR, PTT)
- urea, kreatinin, K, Na, Cl, glykémie, albumin, jaterní testy, CB, prealbumin, CRP.
- RTG plic
- EKG křivku prosím sebou
- doplňková vyšetření dle onemocnění nemocného (DM – diabetologické, převedení na inzulin?, CHOPN – spirometrické, srdeční vady, kardiologické atd.)
- vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon

Platnost vyšetření u nemocných:

ASA II – III ne starší 1 měsíc, nedošlo-li v tomto období k závažné změně zdravotního stavu.

ASA IV a více - ne starší 1 týden, nedošlo-li v tomto období k závažné změně zdravotního stavu.

Vysazení farmak ovlivňující krevní srážlivost před výkonem (*uvedeny minimální doby*)

- | | |
|------------|---|
| 7 - 10 dnů | acidum acetylsalicylicum, ticlopidin, (Anopyrin, Godasal, Agrenox, APO-TIC, Plavix, Trombex, Zylt) |
| 7 dnů | prasugrel (Efient, Clopidoprel) |
| 3 - 5 dnů | warfarin |
| 2 dny | abciximab (Reopro) |
| 1 - 2 dny | indobufen, sulodexid, dabigatran, ticagrel, eptifibatid (Ibustrin, Vessel Due, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) |

Vysazení perorálních antidiabetik (PAD)

48 hodin před operačním výkonem: metformini hydrochloridum

4 hodin před operačním výkonem: ostatní PAD

Děkujeme za spolupráci.

.....
jmenovka a podpis lékaře