

DĚTSKÁ KLINIKA FNOL

Ředění i. v. podávaných antibiotik

Fm-L009-040-DK-012

verze č. 1, str. 1/1

<u>Název léčiva (generikum)</u>	<u>Ředění léků</u>	<u>Způsob podání</u>	<u>Uchování po naředění</u>
ABAKTAL (pefloxacin)	1 amp do 250 ml 5% G	i.v. 60 min	24 hod při 2-8°C
ABELCET (amphotericinum B)	5% G	Přes filtr, konečná konc. 1mg/1ml, u dětí 2mg/1ml	24 hod při 2-8°C
AMIKIN (amikacin) 500mg, 1g	FR1/1, 5% G	Samostatně, i.v. 30-60min, kojenci 60-120min	24 hod při 2-8°C
AMOKSIKLAV (amoksicilin) 600mg, 1,2g	Aqua, FR1/1	Samostatně, i.v. 3-4 min, inf. 30-40min,	8 hod při 5°C
AMPHOCIL (amphotericinum B) 50mg, 100mg	Aqua	Doředit 5%G do konečné konc. 0,6mg/1ml Inf. 1mg/kg/hod	24 hod při 2-8°C
AMPICILIN (ampicillinum) 500mg, 1g	Aqua	i.v. 3 min, inf. 15-30 min	hned
AXETINE (cefuroximum) 750mg, 1,5g	Aqua	Doředit do 50ml 5%, 10% G, FR1/1, inf. 30 min	24 hod 2-8°C
BISEPTOL 480 (sulfmethoxazolum+trimethoprimum)	Bez ředění	Doředit do FR1/1, 5%, 10% G, inf. 60-90 min	hned
CEFAZOLIN (cefazolinum) 1g	Aqua, FR1/1 min. 4 ml	Samostatně, i.v. 2-3 min, inf. 50-100ml 20-30 min	24 hod při 2-8°C
CEFOBID (cefoperazonum) 1g	Aqua, FR1/1, 5% G 20-100ml	i.v. 3-5 min, inf. 15-60 min	24 hod při 2-8°C
CEFOTAXIME (cefotaximum)	Aqua	i.v. 3-5 min, inf. 20-40 min	hned

CEFTAX 1000 (ceftazidimum)	Aqua	Doředit 40-100ml FR1/1, 5%G, inf. 20-60 min	hned
CEFTAZIDIM KABI (ceftazidimum)	Aqua		6 hod při 25°C 12 hod při 5°C
CEFTRIAXON KABI (ceftriaxonum dinatricum) 1g, 2g	Aqua	i.v. 2-4 min nebo inf., samostatně, NE s Ca!	12 hod při 25°C 48 hod při 2-8°C
CEFTRIAXON MEDOPHARM (ceftriaxonum)1g	Aqua	i.v. nebo inf., samostatně, NE s Ca!	24 hod při 2-8°C
CEFTRIAXON SANDOZ (ceftriaxonum dinatricum) 1g	Aqua	i.v. 2-4 min, inf. 30 min., samostatně, NE s Ca!	hned
CEFUROXIM KABI (cefuroximum) 750mg, 1,5g	Aqua	iv. 3-5 min, inf. 30-60 min	5 hod při 2-8°C
CIPHIN (ciprofloxacinum)200mg/100ml	Bez ředění	Inf. 60 min, samostatně	Do spotřebování v obalu do 25°C
CLINDAMYCIN KABI (clindamycinum) 150mg/1ml	FR 1/1, 5%G	Inf. 10-40min., výsl. koncentrace 12mg/1ml, samostatně	24 hod. 2-8°C
COLOMYCIN (colistimethatum natricum) 1mil IU	Aqua, FR 1/1	i.v. 5-30 min, inhal	i.v. hned inhal. 24hod při 2-8°C
CYMEVENE (ganciclovirum) 500mg	Aqua, KARCINOGEN !	Doředit do FR 1/1, 5%G, inf. 60 min, NE BOLUS!	12 hod při 25°C
DALACIN (clindamycini) 300mg/2ml 600mg/4ml	Aqua, 5%G, FR1/1, max konc. 18mg/1ml	Inf. 10-60 min, rychlost do 30mg/min, NE BOLUS !	24 hod při 2-8°C
EDICIN (vancomycinum hydrochloridum) 500mg, 1g	10ml nebo 20ml aqua	Doředit do 100/200ml, inf. 60 min a více, NE BOLUS !	96 hod při 2-8°C
ERYTROCIN (erytromycinum) 1g	20ml Aqua	Doředit FR1/1 do konc. 5mg/1ml, Inf. 20-60 min, kontinuál. do konc. 1mg/1ml - 8 h, NE BOLUS	24 hod při 2-8 °C
FORTUM (ceftazidimum) 500mg, 1g, 2g	Aqua	Inf 50ml kompatibilního roztoku	12 hod při 25°C 7 dní při 2-8°C

GENTAMICIN (gentamicinum) 40mg, 80mg, 240 mg	100ml FR 1/1, 5%G	Inf. 30-60 min	hned
IMIPENEM/CILASTATIN KABI (imipenemum/cilastatinum) 250mg, 500mg	Aqua, FR 1/1	i.v. 20-30 min <500mg nebo 40-60 min > 500mg	hned
KLACID (clarithromycinum) 500mg	Aqua	Doředit 250ml FR1/1, 5%G, 60 min, NE BOLUS	24 hod 2-8°C
MAXIIME (cefepimi hydrochloridum monohydricum) 1g, 2g	Aqua, FR 1/1, 5%G	i.v. 3-5 min, inf. 30 min	24 hod při 2-8°C
MERONEM (meropenemum) 500mg, 1g	Aqua	i.v. 5 min, inf. 15-30 min	hned
MEROPENEM HOSPIRA (meropenem) 500mg, 1g	10 nebo 20ml Aqua	i.v. 5 min, inf. 15-30 min	hned
MEROPENEM RANBAXY (meropenemum) 1g	Aqua na konc. 50mg/1ml	i.v. 5 min, inf. 15-30 min	hned
METRONIDAZOL (metronidazolum) 500mg	Bez ředění nebo FR 1/1, 5%G	Inf. 30-60 min	hned
MYCAMINE (micafunginum)	FR 1/1, 5%G	Inf. pomalu 60 min	hned
MYCOMAX (fluconazolum) 200mg/2ml	Bez ředění	Inf. 60 min, děti 120 min	hned
NETROMYCINE (netilmicinum) 200mg/2ml	FR 1/1, 5%G	i.v. 3-5 min, inf. 30-120 min, samostatně	hned
PENICILIN G 1,0; 5,0 draselná sůl (penicillinum)	Aqua, FR 1/1, 5%G	i.v., megadávky v inf.	hned
PIPERACILIN/TAZOBACTAM IBIGEN (piperacillinum/tazobactanum)	Aqua, FR 1/1, 5%G	Inf. 30 min, NE s R/L !	24 hod při 2-8°C

PROSTAPHLIN (oxacillinum natricum monohydricum) 1g	Aqua, FR 1/1	i.v. 10 min, NE RYCHLE – KŘEČE ! , inf. do 6 hod	hned
SEFOTAK (cefotaximum natricum) 1g	FR 1/1, 5%G	i.v. 3-5 min, inf. 20 min	hned
SULPERAZON (cefoperazonum natricum+sulbactamum natricum) 2mg	Aqua	i.v. 3 min, inf. 15-60 min	hned
TARGOCID (teicoplaninum) 200mg	Aqua	iv. 3-5 min, inf. 30 min, samostatně	24 hod při 2-8°C
TAZIP 4g/0,5g (piperacillin+tazobactamum)	Aqua, FR 1/1	Inf. 30 min	24 hod při 2-8°C
TAZOCIN 4g/0,5g (piperacilin+tazobactam)	Aqua, FR 1/1, 5%G	Inf. 30 min	hned
TIENAM (imipenemum monohydricum+cilastatinum natricum)	100ml FR 1/1	Inf. 20-30 min, samostatně	hned
UNASYN (ampicillinum/sulbactamum)	Aqua, FR1/1	i.v. 3 min, inf. 15-30 min	hned
V-FEND (voriconazolum)	19ml aqua, FR1/1	Inf. 1-3 hod, samostatně, NE BOLUS !	24 hod při 2-8°C
VULMIZOLIN 1,0 (cefazolinum natricum)	Aqua, FR 1/1, 5%G	i.v. 2-3 min, inf. 20-30 min	24 hod při 2-8°C
ZINACEF (cefuroximum) 750mg, 1,5g	Aqua 6ml nebo 15 ml	i.v. 3-5 min, inf. 30-60 min	5 hod při 25°C, 48 hod při 2-8°C