

TRIAGE PACIENTŮ

Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, praktická sestra

PRIORITA P1
OŠETŘENÍ LÉKAŘEM IHNEDE

PRIORITA P2
OŠETŘENÍ LÉKAŘEM DO 60 MINUT

PRIORITA 3
OŠETŘENÍ LÉKAŘEM 120 MINUT

STUPEŇ NALÉHAVOSTI	P1	P2	P3
PORUCHA VĚDOMÍ (kvantitativní dle GCS)	≤ 9	10–14	15
PULZ /min	> 141 < 40	120-140 39-50	51–119
KREVNÍ TLAK syst. (mmHg)	< 80	81–99	> 100
SpO ₂ (bez suplementace O ₂) TRIAGE NEMOCNÝCH S OXYGENOTERAPIÍ v PNP skóre respiračního distresu nemocných léčených oxygenoterapií v PNP – viz strana 2	< 85	86-94	95–100
VAS dospělý pacient (nutné objektivní posouzení ze strany NLZP)	9-10	5-8	1–4
FACES-SCALE dětský pacient (nutné objektivní posouzení ze strany NLZP)	7-10	4-6	0–3
TĚLESNÁ TEPLOTA (měřeno IR tep. v jugulu)	< 32 °C	32,1-35 °C > 38 °C	35,1–37,9 °C

TRIAGE DLE SPECIFIKACE – viz INFORMACE PRIMÁŘE URGENT FNOL č. 5/2016

Při akutní bolesti s VAS > 5 a potenciální možnosti použití anesteziologických technik analgezie (periferní blokáda) konzultuj lékaře ER!

PŘI NEJASNOSTI VŽDY KONZULTACE S TŘÍDÍCÍM LÉKAŘEM!

Skóre míry respiračního distresu nemocných léčených oxygenoterapií v PNP

SpO ₂ měřena bez suplementace kyslíkem – posádka ZZS v PNP	Body
> 90 %	0
85–89 %	1
80–84 %	2
< 79 %	3

Dechová frekvence – TRIAGE URGENT	Body
< 20/min	0
21–29/min	1
30–35/min	2
> 35/min	3

Objektivní posouzení dušnosti: schopnost mluvit – TRIAGE URGENT	Body
Dušnost není v řeči patrná, hovoří zcela souvisle	0
Dušnost je patrná, ale mluví souvisle ve větách (<i>několik vět</i>)	1
Výrazně limitován dušností, nucené pauzy mezi větami (<i>1 věta</i>)	2
Pro dušnost není schopen dokončit celou větu (<i>pouze slova</i>)	3

SpO ₂ s maximální konvenční oxygenoterapií v PNP – TRIAGE URGENT	Body
SpO ₂ ≥ 96 %	0
SpO ₂ 95–92 %	1
SpO ₂ 91–90 %	2
SpO ₂ ≤ 89 %	3

Celkové skóre	
----------------------	--

**Priorita P1, směrování na ER pro klinické známky respiračního selhání:
≥ 8 BODŮ nebo dosažení jedné z červených hodnot**

Priorita P2, směrování na expektační lůžka: < 8 BODŮ

Pacient na domácí dlouhodobé oxygenoterapii – volej třídícího lékaře.

Konvenční oxygenoterapie v PNP: O₂ polomaskou 6–10 l/min, po dobu minimálně 5 minut