

UPOZORNĚNÍ:  **VYPLŇUJTE vždy samostatně pouze list s černým a modrým tiskem, jedná se o SAMOPROPISOVACÍ TISKOPIS!**

A**HLÁŠENÍ POHLAVNÍ NEMOCI****DŮVĚRNÉ**

IČ/PČZ odd. R. č. / č. obce bydl.

Zdravotnické zařízení oddělení: Adresa bydliště: okres: Jiná adresa obvyklého pobytu:

Pozn.: V následující části vždy označte odpovídající možnost (při volbě „jiná“, „jinak“ apod. specifikujte na vyznačený řádek).

Ekonomická aktivita

1. dítě, žák, student, učeň
2. zaměstnaný + OSVČ
3. v domácnosti / se zajištěným příjmem
4. nepracující důchodce
5. nezaměstnaný
6. ostatní / bez zajištěného příjmu
9. nejištěna

Vzdělání

1. bez vzdělání
2. základní
3. střední bez maturity
4. střední s maturitou
5. vysokoškolské
9. nejištěno

Etnikum

1. Čech
2. Rom
3. jiné
9. nejištěno

Země původu

1. Česká republika
2. jiná

Státní příslušnost

1. Česká republika
2. jiná

Rodinný stav

1. svobodný/á
2. ženatý / vdaná
3. rozvedený/á
4. ovdovělý/á
9. nejištěn

Stálé partnerské soužití

1. ano
2. ne

Způsob přenosu

1. heterosexuální styk
2. homosexuální styk
3. z matky na dítě
4. jinak
9. nejištěno

Země nákazy

1. Česká republika
2. jiná

Výskyt onemocnění

1. poprvé v životě
2. reinfekce

Onemocnění zjištěno

1. náhodně
2. při povinném vyšetření
3. pro typické obtíže
4. pro atypické obtíže
5. depistáží
6. při narození
7. při potratu / porodu mrtvého dítěte
8. při úmrtí

Sexuální a ostatní rizika (zakroužkujte i kombinaci uvedených možností)

1. prostituce
2. promiskuita
3. náhodný styk
4. styk s cizincem
5. nechráněný styk
6. anální styk
7. krvavé sex. praktiky
8. pornoherce/čka
9. alkoholik
10. i. v. uživatel drog
11. vazba, vězeň
12. bezdomovec
13. jiná
99. nejištěna

HIV status

1. negativní
2. nově pozitivní
3. dřívější pozitivita
9. nejištěno

Gravidita / týden

1. ano
2. ne

Onemocnění matky léčeno (zakroužkujte i kombinaci uvedených možností)

1. před porodem
2. v graviditě PNC řádně
3. v graviditě PNC nedostatečně
4. v graviditě non-PNC řádně
5. v graviditě non-PNC nedostatečně
6. v graviditě neléčena

Onemocnění matky zjištěno

1. před graviditou
2. v I. trimestru
3. ve II. trimestru
4. ve III. trimestru
5. při porodu
6. po porodu

Datum 1. návštěvy: den měsíc rok Datum vyšetření: den měsíc rok Datum zahájení léčby: den měsíc rok Diagnóza 1*:

1. akutní
2. chronická

Diagnóza 2*: Diagnóza 3*: **Diagnóza potvrzena (zakroužkujte i kombinaci uvedených možností)**

1. kultivačně
2. mikroskopicky
3. PCR / jiná molekulárně genetická metoda
4. v zástinu
5. netreponem. testy (RPR, VDRL)
6. anti syfilis EIA
7. anti syfilis IgM
8. western blot IgG
9. TPI test
10. TPFA/TP-PA
11. FTA-ABS
12. pitva
13. jinak

Léčen

1. ambulantně
2. při hospitalizaci
3. neléčen

ATB / léčba (zaškrtněte i kombinaci uvedených možností)

1. Aminopenicilin ☐
2. Azithromycin ☐
3. Penicilin i.m. ☐
4. Penicilin i.v. ☐
5. Ceftriaxon ☐
6. Cefixim ☐
7. Tetracyklinová ATB ☐
8. Makrolidy ☐
9. Ofloxacin, Ciprofloxacin ☐
10. jiná ATB ☐

Kombinace s jinými sexuálně přenosnými nemocemi (s A49.3, A56, A60, A63, A64, B20, B37.3, B37.4, B85, B86, N34.1)

1. ano
2. ne

DG1: DG2: DG3: **ATB/citlivost (pouze u dg. A54 a A57 prokázáno kultivačně)**

1. azithromycin ☐
2. ciprofloxacin ☐
3. spectinomycin ☐
4. cefixim ☐
5. ceftriaxon ☐
6. gentamycin ☐
7. penicilináza ☐

„+“ citlivý, ano
 „-“ rezistentní, ne
 „NT“ netestován

Zdroj

1. znám
2. neznám

Kontakty

1. ano
2. ne

Statistická klasifikace:**

1. pravděpodobný případ
2. potvrzený případ

Datum hlášení: den měsíc rok

*) viz tabulka diagnóz na listu B (z druhé strany formuláře).

**) viz text na druhé straně formuláře. POZOR! Musí korespondovat s polem Diagnóza potvrzena!

SEVT: 93.024.3

1/14

Razítko a podpis lékaře

2369/2014

53024300

DŮVĚRNĚ

B **Diagnózy dle podrobného seznamu MKN – 10****A 50 VROZENÁ SYFILIS:**

- .0 – časná s příznaky (do 2 let od narození)
- .1 – časná latentní (bez klin. projevů s poz. serolog. reakcí a neg. testem v likvoru)
- .2 – časná vrozená syfilis, NS
- .3 – pozdní vrozená syfil. okulopatie
- .4 – pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
- .5 – jiná pozdní s příznaky (2 a více let po narození)
- .6 – pozdní, latentní (bez klin. projevů, s poz. serolog. reakcí a neg. testem v likvoru)
- .7 – pozdní vrozená syfilis, NS
- .9 – vrozená syfilis NS

A 51 ČASNÁ SYFILIS:

- .0 – primární genitální syfilis
- .1 – primární řitní syfilis
- .2 – primární syfilis jiných lokalizací
- .3 – sekundární syfilis kůže a sliznic
- .4 – jiná sekundární syfilis
- .5 – časná syfilis, latentní (získaná bez klin. projevů s poz. serolog. reakcí a neg. testem v likvoru do 2 let po infekci)
- .9 – časná syfilis, NS

A 55 LYMPHOGRANULOMA VENEREUM (CHLAMYDIOVÝ):**A 57 CHANCROID – ULCUS MOLLE:****A 52 POZDNÍ SYFILIS:**

- .0 – kardiovaskulární syfilis
- .1 – neurosyfilis s příznaky
- .2 – asymptomatická neurosyfilis
- .3 – neurosyfilis, NS
- .7 – jiná pozdní syfilis s příznaky
- .8 – pozdní syfilis, latentní
- .9 – pozdní syfilis, NS

A 53 JINÁ A NEURČENÁ SYFILIS:

- .0 – latentní – neurč. jako časná nebo pozdní
- .9 – syfilis, NS

A 54 GONOKOKOVÁ INFЕКCE:

- .0 – dolního pohl. a moč. ústrojí bez abscesu periuretrálních a přídav. žláz
- .1 – dolního pohl. a moč. ústrojí s abscesem periuretrálních a přídav. žláz
- .2 – pelvipéritonitida a jiné gonokokové infekce pohl. a moč. ústrojí
- .3 – oka
- .4 – svalové a kosterní soustavy
- .5 – gonokoková faryngitida
- .6 – řiti a rekta
- .8 – jiné gonokokové infekce
- .9 – gonokokové infekce, NS

Výňatek z přílohy č. 27 vyhlášky MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce:

Systém epidemiologické bdělosti získané nebo vrozené syfilis**Čl. 2 Laboratorní diagnostika****A. Potvrzený případ – nejméně jeden z následujících nálezů:**

1. Průkaz *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* mikroskopickým vyšetřením v zástinu v exsudátu z lézí, ve tkáni, v pupeční šňůře, placentě nebo výtoku z nosu
2. Průkaz *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* přímou imunofluorescencí v exsudátu z lézí, ve tkáni, v pupeční šňůře, placentě nebo výtoku z nosu
3. PCR průkaz *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* v exsudátu z lézí, ve tkáni, v pupeční šňůře, placentě nebo výtoku z nosu
4. Detekce specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* pomocí screeningového testu (např. TPHA, TP-PA, EIA aj.) a zároveň detekce specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* ve třídě IgM
5. U vrozené syfilis detekce specifických protilátek IgM proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* a zároveň detekce nespecifických protilátek v netreponemovém testu (např. VDRL, RPR)

B. Pravděpodobný případ – nejméně jeden z následujících nálezů:

1. Detekce specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* pomocí screeningového testu (např. TPHA, TP-PA, EIA aj.) a zároveň potvrzení specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* ve třídě IgG metodicky nezávislým testem (FTA-ABS IgG, western blot IgG)
2. U vrozené syfilis detekce nespecifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* v netreponemovém testu (např. VDRL, RPR) v likvoru
3. U vrozené syfilis detekce specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* pomocí screeningového testu (např. TPHA, TP-PA, EIA aj.) a zároveň potvrzení specifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* ve třídě IgG metodicky nezávislým testem (FTA-ABS IgG, western blot IgG) u matky
4. U vrozené syfilis detekce nespecifických protilátek proti *Treponema pallidum* subspecies *pallidum* v netreponemovém testu (např. VDRL, RPR) ve čtyřnásobně vyšším titru než u matky