

APFEL SKÓRE

Rizikové faktory pooperační nevolnosti a zvracení (PONV)	
Nekuřák	= 1
Ženské pohlaví	= 1
Pooperační podání opioidů	= 1
PONV / kinetóza v anamnéze	= 1

Apfel skóre	Terapie
0	---
1	---
2	Ondasetron 4mg i.v.
3	Ondasetron 4mg i.v., Degan 10 mg i.v.
4	Ondasetron 4mg i.v., Degan 10 mg i.v., Dexamethason 4mg i.v.

HODNOCENÍ DLE C-D KLASIFIKACE (závažnost dle Clavien-Dindo klasifikace)

Stupeň	
I.	Jakákoli odchylka od normálního pooperačního průběhu bez nutnosti farmakologické léčby, případně chirurgických, endoskopických a radiologických intervencí. Povolené terapeutické režimy jsou: léky jako antiemetika, antipyretika, analgetika, diuretika a elektrolyty a fyzioterapie. Tento stupeň také zahrnuje infekce ran revidovaných na lůžku.
II.	Potřeba farmakologické léčby jinými léky než těmi, které umožňují komplikace I. stupně. Zahrnuty jsou: krevní transfuze a celková parenterální výživa.
III.	Vyžaduje chirurgický, endoskopický nebo radiologický zákrok.
IIIa.	Intervence nevyžaduje celkovou anestezii.
IIIb.	Intervence v celkové anestezii.
IV.	Život ohrožující komplikace (včetně komplikací centrálního nervového systému) vyžadující léčbu na jednotce intenzivní péče.
IVa.	Dysfunkce jednoho orgánu (včetně dialýzy).
IVb.	Multiorgánová dysfunkce.
V.	Smrt pacienta.