

Indikátory kvality - Sledování četností a stupně kognitivních poruch (pomocí testu kognice) a poruch soběstačnosti (testem ADL) u hospitalizovaných pacientů oddělení geriatric za rok 2020


Sledování **Testů kognitivních funkcí** - Oddělení 46

Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	32	27	59	36,8 %	25	15	40	32,8 %	99	35,1 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	20	23	43	26,8 %	26	8	34	27,8 %	77	27,3 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	16	18	34	21,3 %	13	20	33	27,0 %	67	23,8 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	15	9	24	15,0 %	6	9	15	12,2 %	39	13,8 %
Celkem				160 pacientů				122 pacientů		282 pacientů	

36,3 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou v I. pololetí.

39,3 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou v II. pololetí.

37,5 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou za rok 2020.




Sledování **Testů kognitivních funkcí za rok 2020** – Oddělení dlouhodobé ošetrovatelské péče 48

Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	5	9	14	51,8 %	5	8	13	40,6 %	27	45,8 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	1	1	2	7,4 %	0	6	6	18,7 %	8	13,6 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	1	7	8	29,6 %	1	6	7	21,8 %	15	25,4 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	0	3	3	11,1 %	2	4	6	18,8 %	9	15,3 %
Celkem				27 pacient				32 pacienti		59 pacientů	

40,7 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou v I. pololetí.

40,6 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou v II. pololetí.

40,7 % - pacientů s poruchou středního stupně a těžkou kognitivní poruchou za rok 2020.




Sledování výsledků **ADL test za rok 2020** (test bazálních všedních činností) - Oddělení 46

Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	0	1	1	0,6 %	1	0	1	0,81 %	2	0,71 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	25	17	42	26,9 %	29	3	32	26,2 %	74	26,6 %
	45 - 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	16	22	38	24,4 %	29	5	34	27,8 %	72	25,9 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	40	35	75	48,0 %	47	8	55	45,1 %	130	46,8 %
Celkem				156 pacientů				122 pacientů		278 pacientů	

I. pololetí: 72,4 %, výrazná porucha soběstačnosti, závislost středního a vysokého stupně.

II. pololetí: 73,0 % s poruchou v ADL testu (závislost středního stupně a vysoce závislý).

Průměr za rok 2020 72,6 %




Sledování výsledků **ADL test za rok 2020** (test bazálních všedních činností) - Oddělení dlouhodobé ošetrovatelské péče 48

Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	12	3	15	20,0 %	6	7	13	12,8 %	28	15,8 %
	45 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	9	6	15	20,0 %	1	23	24	23,8 %	39	22,0 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	27	19	46	60,5 %	26	38	64	63,3 %	110	62,1 %
Celkem				76 pacientů				101 pacientů		177 pacientů	

I. pololetí: 61,8 % pacientů v závislosti středního a vysokého stupně. Nesoběstační.

II. pololetí: 87,1 % nesoběstační (závislost středního stupně a vysoce závislí).

Průměr za rok 2020 84,1 %



Zhodnocení:

Trvá vysoký počet nemocných vysoce závislých na pomoci druhé osoby vyžadující ošetrovatelskou péči a nácvik rehabilitace.

Počet nemocných zhodnocených testem kognice byl ovlivněn epidemiologickou situací (pandemie Covid-19) a nedostatkem kmenového personálu, proškoleného v administraci testu.