

Indikátory kvality – Sledování četností a stupně kognitivních poruch (pomocí testu kognice) a poruch soběstačnosti (testem ADL) u hospitalizovaných pacientů oddělení geriatrie za rok 2024.

Sledování **Testů kognitivních funkcí** – Oddělení 46


Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	68	46	114	51,8 %	39	48	87	44,2 %	201	48,2 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	19	25	44	20,0 %	13	22	35	17,8 %	79	18,9 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	17	22	39	17,7 %	28	24	52	26,4 %	91	21,8 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	10	13	23	10,5 %	12	11	23	11,7 %	46	11,0 %
	TESTOVÁNO			220	99,1 %			197	92,5 %	417	95,9 %
	NETESTOVÁNO			2	0,9 %			16	7,5 %	18	4,1 %
Celkem hospitalizováno				222				213		435	

I. pololetí: testováno 99,1 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
28,2 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
48,2 % testovaných je s kognitivní poruchou

II. pololetí: testováno 92,5 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
38,1 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
55,8 % testovaných je s kognitivní poruchou

Průměr za rok 2024: testováno 95,9 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
32,9 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
51,8 % testovaných je s kognitivní poruchou

KOGNICE 2024 (odd. 46)




Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	24	28	52	50,0 %	20	16	36	36,0 %	88	43,1 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	11	13	24	23,1 %	11	14	25	25,0 %	49	24,0 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	10	6	16	15,4 %	14	9	23	23,0 %	39	19,1 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	6	6	12	11,5 %	8	8	16	16,0 %	28	13,7 %
	TESTOVÁNO			104	99,0 %			100	97,1 %	204	98,1 %
	NETESTOVÁNO			1	1,0 %			3	2,9 %	4	1,9 %
Celkem hospitalizováno				105				103		208	

I. pololetí: testováno 99,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
26,9 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
50,0 % testovaných je s kognitivní poruchou

II. pololetí: testováno 97,1 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
39,0 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
64,0 % testovaných je s kognitivní poruchou

Průměr za rok 2024: testováno 98,1 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
32,8 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
56,9 % testovaných je s kognitivní poruchou

KOGNICE 2024 (odd. ODOP 48)



2IKaGER – oddělení geriatric


Sledování výsledků **ADL** testu **za rok 2024** (test bazálních všedních činností) - Oddělení 46

Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	2	1	3	1,4 %	0	0	0	0,0 %	3	0,7 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	39	21	60	27,0 %	19	15	34	16,3 %	94	21,8 %
	45 – 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	26	31	57	25,7 %	29	31	60	28,7 %	117	27,1 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	47	55	102	45,9 %	46	69	115	55,0 %	217	50,3 %
	TESTOVÁNO			222	100 %			209	99,1 %	431	99,5 %
	NETESTOVÁNO			0	0,0 %			2	0,9 %	2	0,5 %
Celkem hospitalizováno				222				211		433	

I. pololetí: testováno 100 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
71,6 % - výrazná porucha soběstačnosti, závislost středního a vysokého stupně

II. pololetí: testováno 99,5 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
83,7 % - s poruchou v ADL testu (závislost středního stupně a vysoce závislý)

Průměr za rok 2024: testováno 99,5 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
77,5 % - výrazná porucha soběstačnosti, závislost středního a vysokého stupně




Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		XII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	15	14	29	27,9 %	12	7	19	18,6 %	48	23,3 %
	45 – 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	16	11	27	26,0 %	16	11	27	26,5 %	54	26,2 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	21	27	48	46,2 %	26	30	56	54,5 %	104	50,5 %
	TESTOVÁNO			104	99,0 %			102	99,0 %	206	99,0 %
	NETESTOVÁNO			1	1,0 %			1	1,0 %	2	1,0 %
Celkem hospitalizováno				105				103		208	

I. pololetí: testováno 99,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
72,1 % pacientů v závislosti středního a vysokého stupně. Nesoběstační.

II. pololetí: testováno 99,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
81,4 % nesoběstační (závislost středního stupně a vysoce závislí)

Průměr za rok 2024: testováno 99,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
76,7 % - nesoběstační (závislost středního stupně a vysoce závislí)



Význam sledování MMSE a ADL:

Dle výsledků je více jak polovina nemocných s kognitivní poruchou a zvyšuje se počet nemocných s nesoběstačností (disabilitou), což vyžaduje trvalý specifický medicínský i ošetrovatelský přístup, rehabilitaci včetně ergoterapie a kognitivní trénink.

Do testování MMSE se nově při příjmu a propuštění nemocných zapojují všeobecné sestry a medici na DPČ – je třeba se zaměřit na znalosti testujících v administraci použitého kognitivního testu (riziko opravování a napovídání subjektu).

Výsledky nadále slouží jako podklad pro:

- systemizaci personálu
- vzdělávání a studium v oboru geriatric
- změny v nastaveném systému provozu oddělení