



Příloha č. 1

PODÁVÁNÍ TAMIFLU A RELENZY V PŘÍPADĚ PANDEMIE CHŘIPKY „PANDEMIC (H1N1) 2009“ V LŮŽKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Antivirotická léčba je určena

- pro hospitalizované pacienty s těžkým průběhem onemocnění

DÁVKOVÁNÍ:

Ke snížení závažnosti i zkrácení průběhu onemocnění je třeba podat protichřipkovou virostatiku co nejdříve. Účinnost byla prokázána v případě, že léčba byla zahájena během dvou dnů po nástupu příznaků.

- **Dospělí a děti starší než 1 rok**

Věk pacienta	Váha v kg	Dávka	Síla tobolky
Starší než 1 rok a mladší než 3 roky	Méně než 15 kg	30 mg 2x denně po dobu 5 dní (JEDNA 30 mg tobolka se užívá 2x denně po dobu 5 dní)	30 mg
Starší než 3 roky a mladší než 7 let	15 – 23 kg	45 mg 2x denně po dobu 5 dní (JEDNA 45 mg tobolka se užívá 2x denně po dobu 5 dní)	45 mg
Starší než 7 let a mladší než 13 let	23 – 40 kg	60 mg 2x denně po dobu 5 dní (DVĚ 30 mg tobolky [celkem 60 mg] se užívají 2x denně po dobu 5 dní)	30 mg
Starší než 13 let DOSPĚLÍ	Více než 40 kg	75 mg 2x denně po dobu 5 dní (JEDNA 75 mg tobolka se užívá 2x denně po dobu 5 dní)	75 mg

- **Děti mladší než 12 měsíců**

Podle změn SPC schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) je dávkování pro děti mladší než 12 měsíců 2 – 3 mg/kg 2x denně po dobu 5 dnů.





Věk pacienta	Dávka
> 3 měsíce až 12 měsíců	3 mg/kg dvakrát denně
> 1 měsíc až 3 měsíce	2,5 mg/kg dvakrát denně
0 až 1 měsíc	2 mg/kg dvakrát denně

Nejsou k dispozici údaje týkající se podávání Tamiflu dětem mladším než jeden měsíc.

Děti s hmotností více než 40 kg a dospělí pacienti, kteří nejsou schopni polykat tobolky, mohou užít odpovídající dávky prostřednictvím otevření tobolky a vysypání obsahu tobolky do malého množství (maximálně jedna čajová lžička) slazeného pokrmu nebo tekutiny. Směs je třeba promíchat a veškerý obsah spolknout okamžitě po jejím přípravě.

Děti s hmotností méně než 40 kg užijí odpovídající dávku přípravku Tamiflu ve formě roztoku připravenou lékárníkem.

PODÁVÁNÍ RELENZY V PŘÍPADĚ PANDEMIE CHŘIPKY „PANDEMIC (H1N1) 2009“

Přípravek Relenza je indikován k léčbě chřipky u dospělých, mladistvých a dětí (≥ 5 let), kteří mají typické příznaky chřipky při výskytu chřipkového onemocnění v okolí.

DÁVKOVÁNÍ:

Dospělí a děti starší než 5 let

Dávkování: 2 inhalace (pomocí přístroje Diskhaler) po 5 mg dvakrát denně (celková denní dávka 20 mg) po dobu pěti dnů.

Léčba by se měla zahájit co nejdříve, a to během 48 hodin od nástupu příznaků u dospělých a během 36 hodin od nástupu příznaků u dětí.

