



Příloha č. 1 MP-L019-01-1

Doporučený režim kojení po aplikaci některých radiofarmak se zřetelem na jejich aplikovanou aktivitu

Radiofarmaka	Aktivita RF aplikovaná matce [MBq]	Doba přerušení kojení [h]
¹⁸ F-FDG	400	0
^{81m} Kr	6 000	0
⁶⁷ Ga	jakákoliv	zastavit
^{99m} Tc-pertechnetát	80	12
-pertechnetát	800	47
-MAA	80	12
-mikrosféry	100	12
-erytrocyty	800	12
-DTPA	80	0
-DMSA	80	0
-deriváty IDA	150	0
-HMPAO	500	0
-MAG3	200	0
-MIBI	1 000	0
-koloid	80	0
-fosfáty	600	0
-tektrotyd	700	24
¹¹¹ In-leukocyty	10	0
¹²³ I-jodid	20	zastavit
-hippuran	20	12
-MIBG	400	zastavit
¹²⁵ I-fibrinogen	jakákoliv	zastavit
¹³¹ I-jodid	jakákoliv	zastavit
²⁰¹ Tl	111	48

Pozn.:

S kojením může být započato ihned po uplynutí uvedené doby od aplikace RF.

U řady RF je ve třetím sloupci uvedena nula, tj. kojení nemusí být přerušeno. V takovém případě se však doporučuje, aby v období po aplikaci matka vynechala jedno kojení; odsáté mléko se znehodnotí. Vzhledem k možnému zevnímu ozáření kojence se doporučuje omezit blízký kontakt matky s dítětem na maximální dobu 5 hodin během následujících 24 hodin po vyšetření.

Tato příloha nepodléhá při změně textu připomínkovému řízení.