

Návod k údržbě pro extenzivní zelené střechy

Poznámka:

Vegetační střecha se považuje za plnohodnotnou až tehdy, kdy je dosaženo žádoucího stavu – zápoje. Tohoto stavu je možné docílit pouze správnou následnou péčí po založení. Tato následná péče po založení trvá 1-2roky. Pokyny a způsob následné péče stanovuje realizátor vegetační střechy a údržbu zajišťuje objednatel na své náklady, není-li dohodnuto jinak (možnost sjednání údržby u realizátora zelené střechy).

Zásadně by měla být péče o zelené střechy svěřena pouze vyškolenému odbornému personálu.

Bezpodmínečně nutná jsou opatření pro zajištění bezpečnosti osob proti pádu, dle platné legislativy a BOZP.

U extenzivních zelených střech připadají v úvahu následující úkony péče a údržby:

- **Zálivka** po založení je zcela zásadním faktorem! Po založení je nutné saturovat řízky/části rostlin/vegetační rohože/rostliny a případně osivo vodou a to 10-20l/m²/týdně a to v minimálně 2-3 dávkách po dobu 2měsíců po založení. Následně se zálivková dávka **postupně!** omezuje. Vliv na saturaci vodou má i roční období, které v případě častějších srážkových úhrnů snižuje nutnost doprovodné zálivky.
- **Odstraňování nežádoucí vegetace - náletu**
Každoročně a průběžně je nutné odstraňovat náletové dřeviny (bříza, vrba,..) a byliny (jetel, pampeliška, vikev apod.), pokud možno i s kořeny a před vysemenění. Odstraněné rostliny je nutné odstranit ze střechy.
- **Odstraňování nežádoucí vegetace z okrajových a bezpečnostních pásů/štěrkových obsypů, dlažeb a zpevněných povrchů**
Nežádoucí vegetaci je nutné odstraňovat nejen z ozeleněných ploch ale také ze štěrkových pásů, cestiček a přilehlých teras.
- **Kosení a odstraňování pokosené hmoty, odstraňování listí** – v případě lučních společenstev *Vegetace typu Sedum-byliny-trávy a trávy-byliny* by se měla jedenkrát do roka v září/říjnu poséct. Výška stříhu: cca. 7 cm. Pokos je nutné odstranit, nesmí zůstat na střeše. Listí napadané z okolních stromů je nutné také odstranit.
- **Hnojení**
Jednou do roka, zpravidla na jaře (duben/květen) se ozeleněná plocha rovnoměrně pohnojí dlouhodobým hnojivem cca. 50 g/m² hnojiva typu Cote s postupným uvolňováním. Především silný výskyt mechů, resp. nápadně červené zbarvení druhů Sedum je známkou nedostatku živin.
- **Čištění kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných odvodňovacích zařízení**
Kontrolní šachty a vpusti pod nimi je nutné každý rok kontrolovat a čistit od nečistot (mraveniště, špína, listí, vápenaté usazeniny apod.). Profil odtoku nesmí být zúžený. Totéž platí i pro odvodňovací žlaby.
- **Dosévání, resp. dosazování chybějících rostlin, příp. doplňování substrátu**
Při výskytu neporostlých ploch, příp. při výskytu eroze na určitých místech je nutné doplnit substrát, nebo vytvořit dosadbu. Vhodným obdobím je duben/květen nebo září/říjen.
- **Ochrana rostlin**
Chemická ochrana rostlin se smí provádět pouze po konzultaci s odborníkem.

Alfagreen s.r.o., IČ:01477099, DIČ:CZ01477099, Petřkova 13, 77900, Olomouc
www.alfagreen.cz, info@alfagreen.cz, tel.:+420 730135030