

Příjmení: Saxena

Titul: Dr.

RČ: 5100065564

Jméno: Shweta

Zdrav. pojišť.: 333

Bydliště matky: Polská 426/31, 77900 Olomouc 9

Dat. příjmu 06.07.21

Čas příjmu 08:20

Porod plodu:	Pohlaví	Hmotnost	Délka	Průběh porodu	Datum porodu	g.h.	Vitalita
Dítě:	A: chlapec	3270	49	sectio caesarea	07.07.21 01:46	38+1	živé
	B:						
	C:						
	D:						

Nepravidelnosti:

Ig/lp in g.h. 38+1
preexistující DM na inzulinu
gestační hypertenze
hrozící hypoxie plodu
akutní cisařský řez

Matka Krevní skupina: B RhD: +

Plod A Krevní skupina: RhD:

Plod B Krevní skupina: RhD:

Epikríza, doporučení:

Rodička Ig/lp přijata v grav.hebd. 38+1 pro preindukci porodu pro DM II. typu na inzulinu, gestační hypertenze. Preindukce porodu Cookovým katetrem, následně pravidelná děložní činnost, pro patologický KTG záznam porod ukončen na brance 4 cm akutním cisařským řezem z indikace akutní ohrožení plodu hypoxií, porozen živý plod mužského pohlaví. GBS-negativní, DM II. typu na inzulinu.

Poporodní poranění: laparotomie sec. Pfannenstiel - na kůži nevstřebatelné jednotlivé stehy
Medikace na odd. šestinedělí: analgetika, chronická medikace, LMWH

KS matky: RhD pozitivní

Průběh hospitalizace: Rané šestinedělí afebrilní, bez komplikací.
Při propuštění pacientka bez problémů, kardiopulmonárně kompenzovaná, afebrilní, děloha se zavinuje, očistky odcházejí serosanguinolentní, laparotomie se hojí per primam, okolí bez zarudnutí, laktace nastupuje, mikce a pasáž v normě, dolní končetiny bez otoků.

Doporučení:

- Extrakce nevstřebatelných stehů 10.-12. den po operaci cestou praktického lékaře či na ambulanci PORGYN kliniky.
 - Hygiena šestinedělí, tělesné šetření, kontrola za 6 týdnů u obvodního gynekologa.
 - Při akutních obtížích (krvácení, bolesti, zapáchající výtok, teplota, zimnice, třesavka) kontrola na ambulanci Porodnicko-gynekologické kliniky kdykoliv.
 - Kontrola v diabetologické ambulanci dle domluvy.
 - Vzhledem k provedenému cisařskému řezu s případnou další graviditou vyčkat nejméně jeden rok.
 - Užívat preparáty železa nejméně 3 měsíce v dávce 1-0-0
 - Vzhledem k provedenému cisařskému řezu indikována prevence TEN - Fraxiparine 0,6 ml s.c. á 24 hod do 10.dne.
- Podrobně poučena, souhlasí.

Zprávu vyplnil: Bittnerová Barbora MUDr.

Dne: 08.09.2021