



Ambulantní zpráva

Pacient: Chu Kung-Te

Bytem: Třída Míru 644/113, 779 00 Olomouc 9, tel. +420777667574

Datum vyšetření: 10.01.24

RČ: 5120026659

ZP: 333

Zpráva ze dne: 10.01.24 11:17 Zapsal: Vaněk Petr MUDr., Ph.D.

Diagnózy:

D1809 Hemangiom neurčené lokalizace

Výkony:

15250 1x SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM D
SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM
DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Ultrazvukový přístroj Samsung Medison RS80A inv.č. I 0028874-000 + příslušenství I028874-001 až
003

Sonografie břicha:

Játra nezvětšena, parenchym normální echogenity, v pravém laloku s S6/7 naznačen hyperechogenní okrsek vel 1 cm, bez dalších patrných ložisek. Žlučové cesty bez dilatace. Žlučník normální velikosti, bez patologického obsahu, stěna není zesílena. Portální žíla normální šíře, toky hepatopetální.
Pankreas nepřehledný pro překryv střevním plynem intraluminálně.
Slezina homogenní, nezvětšena.
Ledviny normálního uložení a velikosti, bez dilatace dutých systémů, bez ložisek, bez litiázy nad 4mm.
Břišní aorta v přehledném rozsahu normální šíře.
Bez volné tekutiny v dutině břišní.

Závěr: Susp. drobný hyperechogenní okrsek S6/7 jater vel. 1 cm, v dif. dg. hemangiom.

Vytištěno dne: 23.04.2024

Nováková Olga



Ambulantní zpráva

Pacient: Chu Kung-Te

Bytem: Třída Míru 644/113, 779 00 Olomouc 9, tel. +420777667574

Datum vyšetření: 10.01.24

RČ: 5120026659

ZP: 333

Zpráva ze dne: 10.01.24 12:31 Zapsal: Vetešník Marek MUDr.

Diagnózy:

D1809 Hemangiom neurčené lokalizace

Výkony:

09119 1x ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

11023 1x KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Provedeno: Interní vyšetření kontrolní (11023)

Kontrolní vyš.

Pacient přichází k došetření nálezu na USG na Taiwanu. V 7/23 zjištěno ložisko jater, doporučeno zopakovat USG s odstupem. Nově si nahmatal také zvětšené uzliny v L axile.

Nehubne, nežloutne, břicho nebolí, neztvětšuje se, je zcela asymptomatický stran GIT onemocnění.

OA: interní onemocnění neguje, operace 0

FA: sine

RA: oba rodiče ca štítné žlázy? otec také ca ledviny, sestra starší - zdravá

PSA: 2. ročník LF UPOL, z Taiwanu

AA: neguje

Objektivně: Hmotnost: 59,50, PR: 69,00, TKS/D: 114/70, TT: 36,8,

KP kompenzován, mesomorfní konstituce, lucidní, orient., bez ikteru a cyanózy, eupnoe, mobilní, spolupracuje.

Břicho: v niveau, měkké, prohmatné, bez resistance, palp. nebolest, aperitoneální, peristaltika +, Blumberg -, Plenies -, Rowsing -, tapot bilat. negat. Játra, slezina nezv. **DKK:** bez otoků

Biochemie-sérum: Na: 142, K: 4,80, Cl: 105, Ca: 2,55, qCa kor: 2,42, Mg: 0,85, Ur: 7,7, KREA: 72, qGFkrea: >1,50, KM: **444**, Bi: 7, ALT: 0,77, AST: 0,41, ALP: 1,46, GGT: 0,54, AMS: 1,16, LIP: 0,52, CB: **85,3**, ALB: 48,0, CRP: <4,0, CH: **5,53**, TAG: 1,28, HDLc: 1,16, LDLc: **3,79**, CH/HDLc: 4,77, qNonHDL: **4,4**, Fe: 18,0, qUIB*: 32,9, FER: 217, FOLn: 28,5, B12n: 393, TIB*: 50,9, **Endokrinologie:** TSH: 1,228, FT4: 12,6, **Diabetologie:** GLU: 5,0, **Krevní obraz:** WBC: 4,80, RBC: 4,94, Hgb: 144, HCT: 0,42, MCV: 84,6, MCH: 29,1, MCHC: 34,4, RDW: 11,7, PLT: 251, MPV: 9,1, **Diferenciál z analyz:** Ly%: 42,9, Mo%: 6,5, Ne%: 48,7, Eo%: 1,3, Ba%: 0,6, Ly#: 2,06, Mo#: 0,31, Ne#: 2,34, Eo#: 0,06, Ba#: 0,03, **Koagulační screening:** Q%: 79, INR: 1,11, Qcas: 12,4, Qnrm: 10,5, aPTT: 31,7, aPTR: 1,13

Sonografie břicha:

Játra nezvětšena, parenchym normální echogenity, v pravém laloku s S6/7 naznačen hyperechogenní okrsek vel 1 cm, bez dalších patrných ložisek. Žlučové cesty bez dilatace. Žlučník normální velikosti, bez patologického obsahu, stěna není zesílena.

Portální žíla normální šíře, toky hepatopetální.

Pankreas nepřehledný pro překryv střevním plynem intraluminálně.

Slezina homogenní, nezvětšena.

Ledviny normálního uložení a velikosti, bez dilatace dutých systémů, bez ložisek, bez litiázy nad 4mm.

Břišní aorta v přehledném rozsahu normální šíře.

Bez volné tekutiny v dutině břišní.

Závěr: Susp. drobný hyperechogenní okrsek S6/7 jater vel. 1 cm, v dif. dg. hemangiom.

Závěr:

* **v.s. Hemangiom jater**

* **Dyslipidémie, zkusí dietní opatření, kontrola za 3m v případě stac. nálezu indikace k léčbě hypolipidemiky**

Doporučení:

- Doplníme MR jater k objektivizaci nálezu na radiologické klinice FNOL.

- pro výsledky si pacient zavolá do s odstupem 2 dnů ambulance 2IK na tel.: **588 443 280**

Dodatek ze dne: 10.01.24 12:37 Zapsal: Fišarová Světluš Mgr.

Diagnózy:



Ambulantní zpráva

Pacient: Chu Kung-Te

Bytem: Třída Míru 644/113, 779 00 Olomouc 9, tel. +420777667574

Datum vyšetření: 20.03.24

RČ: 5120026659

ZP: 333

Zpráva ze dne: 20.03.24 13:02 Zapsal: Chudoba Adam MUDr.

Diagnózy:

D1809 Hemangiom neurčené lokalizace

Výkony:

09511 1x MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

Pacient telefonicky informován v anglické jazyce o výsledku MR vyšetření jater, nutnosti vzhledem k drobným cystám jater absolvovat kontrolní UZ jater jednou za 1-2 roky, rozumí, souhlasí, doporučeno se dostavit pro výsledky osobně. Bude si tak moci výsledek a doporučení přeložit do anglického jazyka ať nedojde ke ztrátě v překladu mluveného slova.

MR jater: Sekvence nativně a postkontrastně, k.l. i.v - Multihance

V jaterním parenchymu dvě drobné hypersignalita T2 v.o. - cysty.

Žlučník má normální velikost, ostré ohraničení a obsah s denzitou tekutiny. Intrahepatické žlučovody nejsou rozšířeny.

Hepatocholedochus má normální šíři. Normální šíře vena portae.

Pankreas je ostře konturovatelný, ve všech částech normální velikosti a homogenní. Ductus pancreaticus není rozšířen.

Okolí pankreatu je klidné.

Slezina má normální velikost a homogenní denzitu.

Obě ledviny jsou normálního tvaru, velikosti i uložení, hladkých kontur. Parenchym je normální šíře, kortikálně na **pravé ledvině** asi **tři drobné cysty velikosti 3 mm**. Duté systémy obou ledvin ani uretery nejsou dilatované. Bez průkazu litíazy. Perirenální a pararenální prostor přiměřené denzity.

Nadledviny mají normální šíři ramének, bez známek ložiskové expanze.

V okolí velkých cév nejsou patrné zvětšené lymfatické uzliny.

V zachyceném rozsahu břicha není přítomna volná tekutina.

Závěr: Na jaterním parenchymu dvě drobné cystičky jinak bez ložisek.

Vytisknuto dne: 23.04.2024

Nováková Olga

Odběr: 15.03.2024 07:24

Žadatel: 2.IK Všeobecná ambulance

Nález:

MR: MR+Obr

Nález:

MR jater:

Sekvence nativně a postkontrastně, k.l. i.v - Multihance

V jaterním parenchymu dvě drobné hypersignality T2 v.o. - cysty.

Žlučník má normální velikost, ostré ohraničení a obsah s denzitou tekutiny. Intrahepatické žlučovody nejsou rozšířeny. Hepatocholedochus má normální šíři. Normální šíře vena portae.

Pankreas je ostře konturovatelný, ve všech částech normální velikosti a homogenní. Ductus pancreaticus není rozšířen. Okolí pankreatu je klidné.

Slezina má normální velikost a homogenní denzitu.

Obě ledviny jsou normálního tvaru, velikosti i uložení, hladkých kontur. Parenchym je normální šíře, kortikálně na pravé ledvině asi tři drobné cysty velikosti 3 mm. Duté systémy obou ledvin ani uretery nejsou dilatované. Bez průkazu litiázy. Perirenální a pararenální prostor přiměřené denzity.

Nadledviny mají normální šíři raméněk, bez známek ložiskové expanze.

V okolí velkých cév nejsou patrné zvětšené lymfatické uzliny.

V zachyceném rozsahu břicha není přítomna volná tekutina.

Závěr:

Na jaterním parenchymu dvě drobné cystičky jinak bez ložisek.

Datum potvrzení: 15.3.2024 08:22:00

Potvrzující lékař: Kovář Radim MUDr.

Zpracoval(a): Nováková Olga

Datum a čas: 23.04.2024 14:16:38